

Liste des arbres indigènes* et rustiques


Consultez de courtes fiches descriptives pour chaque arbre :

Exemple de fiche descriptive

- Photo de l'espèce
- Nom latin
- Nom français
- Nom anglais
- Grandeur moyenne de l'arbre à maturité
- Couleur et caractéristique du feuillage
- Fleur produite
- Fruit produit
- Exposition requise
- Caractéristique unique de l'arbre



Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Russian olive

Dimensions  10 m
8 m

Feuillage  Feuillage vert grisâtre au revers argenté

Fleur  Floraison au printemps, fleur jaunâtre odorante

Fruit  Olive grisâtre, comestible

Exposition  Soleil

Caractéristique unique Nourrit les oiseaux
Feuillage exceptionnel 

 Cliquez sur le nom de l'arbre ci-dessous pour visualiser la fiche descriptive.

Feuillus

Latin	Français	Anglais
Acer ginnala	Érable de l'Amur	Amur maple
Acer nigrum*	Érable noir	Black maple
Acer pensylvanicum*	Érable de Pennsylvanie	Striped maple
Acer rubrum*	Érable rouge (2 fiches)	Red maple
Acer saccharinum*	Érable argenté	Silver maple
Acer saccharum*	Érable à sucre	Sugar maple
Acer spicatum*	Érable à épis	Mountain maple
Aesculus glabra	Marronnier de l'Ohio	Ohio Buckeye
Aesculus hippocastanum	Marronnier d'Inde	Common Horsechestnut
Amelanchier spp.*	Amélanchiers (2 fiches)	Serviceberries
Betula alleghaniensis*	Bouleau jaune	Yellow birch
Betula cordifolia*	Bouleau à feuille cordées	Mountain paper birch
Betula nigra	Bouleau noir	River birch
Betula papyrifera*	Bouleau blanc (ou à papier)	White birch
Betula populifolia*	Bouleau gris	Gray birch
Carpinus caroliniana*	Charme de Caroline	Blue-beech
Carya cordiformis*	Caryer cordiforme	Bitternut hickory
Carya ovata*	Caryer ovale	Shagbark hickory
Catalpa speciosa	Catalpa de l'ouest	Northern catalpa
Celtis occidentalis*	Micocoulier occidental	Common Hackberry
Corylus colurna	Noisetier de Byzance	Turkish Filbert
Elaeagnus angustifolia	Olivier de Bohème	Russian olive
Fagus grandifolia*	Hêtre à grandes feuilles	American beech
Gleditsia spp.	Févier	Thornless common
Gymnocladus dioicus	Chicot du Canada	Kentucky Coffeetree
Juglans cinerea*	Noyer cendré	Butternut
Juglans nigra	Noyer noir	Black Walnut
Liriodendron tulipifera	Tulipier de Virginie	Tulip tree
Ostrya virginiana*	Ostryer de Virginie	Ironwood
Platanus occidentalis	Platane de Virginie	American Planetree
Prunus pensylvanica*	Cerisier de Pennsylvanie	Pin cherry
Prunus serotina*	Cerisier tardif	Black cherry
Quercus Spp.	Chêne (7 fiches)	Oak
Robinia pseudoacacia	Robinier faux-acacia	Locust false acacia
Tilia americana*	Tilleul d'Amérique	Basswood
Tilia cordata	Tilleul à petites feuilles	Littleleaf linden
Ulmus pumila	Orme de Sibérie	Siberian elm

Conifères

Latin	Français	Anglais
Abies balsamea*	Sapin baumier	Balsam fir
Ginkgo biloba	Arbre aux quarante écus	Maidenhair tree
Larix laricina*	Mélèze laricin	Tamarack
Picea abies	Épinette de Norvège	Norway spruce
Picea glauca*	Épinette blanche	White spruce
Picea mariana*	Épinette noire	Black spruce
Picea omorika	Épinette de Serbie	Serbian spruce
Picea pungens	Épinette du Colorado	Colorado spruce
Picea rubens*	Épinette rouge	Red spruce
Pinus banksiana*	Pin gris	Jack pine
Pinus nigra	Pin noir d'Autriche	Austrian pine
Pinus resinosa*	Pin rouge	Red pine
Pinus strobus*	Pin blanc	Eastern white-pine
Pinus sylvestris	Pin sylvestre	Scotch pine
Tsuga canadensis*	Pruche du Canada	Eastern hemlock





Acer ginnala 'Flame' Érable de l'amur 'Flame' 'Flame' Amur maple

Dimensions



Feuillage



Feuille trilobée

Couleur à l'automne : rouge orangé et écarlate

Fleur



Floraison au printemps, nombreuse
et blanchâtre

Fruit



Samare

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Feuillage attrayant à l'automne





Acer nigrum

Érable noir

Black maple

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée, 3 à 5 lobes peu profonds
Vert foncé tournant au jaune en automne

Fleur



La floraison a lieu de la fin avril à la mi-mai

Fruit



Disamare

Exposition




Ombre légère / plein soleil

Caractéristique unique

Espèce vulnérable au Québec, menacée aussi par l'activité humaine.





Acer pensylvanicum

Érable de Pennsylvanie

Striped maple

Dimensions



Feuillage



Feuille trilobée

Vert lumineux, jaune à l'automne

Fleur



Fleur verte, en mai

Fruit



Samare en forme de croissant

Exposition



Ombre / soleil

Caractéristique unique

Arbre très décoratif






Acer rubrum 'Marmo'

Érable rouge 'Marmo'

'Marmo' Red maple

Dimensions



Feuillage



Feuille trilobée

Couleur à l'automne : rouge orangé

Fleur



Floraison au printemps, rouge et nombreuse

Exposition




Soleil /mi-ombre



Image
non
disponible

Acer rubrum 'Armstrong Gold' Érable rouge 'Armstrong Gold' 'Armstrong gold' Red maple

Dimensions



Feuillage



Feuille pentalobée

Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, fleur petite et sans intérêt

Fruit



Samare

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Arbre long et étroit





Acer saccharinum 'Silver Queen'

Érable argenté 'Silver Queen'

'Silver Queen' Silver maple

Dimensions



Feuillage



Feuille à 5 lobes

Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps,

grappe retombante

Fruit



Disamare

Exposition



Soleil /mi-ombre /ombre

Caractéristique unique

Floraison avant la feuillaison





Acer saccharum

Érable à sucre

Sugar maple

Dimensions



Feuillage



Feuille de 3 à 5 lobes

Couleur à l'automne : jaune, orangé à rouge

Fleur



Floraison au printemps, corymbe

jaune verdâtre

Fruit



Disamare

Exposition



Soleil /mi-ombre






Acer spicatum

Érable à épis

Mountain maple

Dimensions



Feuillage



Feuillage : 3 à 5 lobes

Couleur à l'automne : rouge, jaune ou brune

Fleur



vert jaunâtre pâle à blanc crème, en épis

Fruit



Samare

Exposition



Ombre /mi-ombre

Caractéristique unique

Sensible à la pollution urbaine






Aesculus glabra

Marronnier de l'Ohio

Ohio Buckeye

Dimensions



Feuillage



Les feuilles composées, palmées, ont cinq folioles
Couleur à l'automne : orangé brillant

Fleur



Les fleurs nombreuses, jaune pâle à verdâtre en
mai et juin

Fruit



Marrons toxiques

Exposition



Plein soleil/ mi-ombre

Caractéristique unique

Attire les colibris et les papillons






Aesculus hippocastanum

Marronnier d'Inde

Commun Horsechestnut

Dimensions



Feuillage



Découpées en sept palmes, vert foncé, jaune d'or à l'automne

Fleur



Fleur blanche tachetée de jaune et de rouge, odeur agréable.

Fruit



Marrons toxiques

Exposition



Ombre légère / plein soleil

Caractéristique unique

Attire les colibris et les papillons






Amelanchier canadensis 'Rainbow Pillar'

Amélanchier du Canada 'Rainbow Pillar'

Serviceberries 'Rainbow Pillar'

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale, cordée

Couleur à l'automne : teinte jaune-rougeâtre orangé

Fleur



Floraison avant et après la feuillaison,

fleur de couleur blanc-crème

Fruit



Petite baie rouge comestible, passera du rouge, au rouge-violet pour finir bleu foncé

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Les fruits sont un régal pour les oiseaux.






Amelanchier canadensis

Amélanchier du Canada

Serviceberries

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale pubescente

Couleur à l'automne : jaune orangé

Fleur



Floraison au printemps, grappe blanche

Fruit



Petit fruit comestible savoureux, très décoratif

Exposition



Soleil /mi-ombre





Betula alleghaniensis

Bouleau jaune

Yellow birch

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale, dentée, alterne de 8 à 12 cm de longueur
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Cône dressé

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Arbre emblématique de Saint-Lazare





Betula cordifolia

Bouleau à feuilles cordées

Montain paper birch

Dimensions



Feuillage



Feuille triangulaire en forme de cœur, alterne
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Strobile

Exposition



Mi ombre / soleil






Betula nigra

Bouleau noir

Black birch

Dimensions



Feuillage



Feuille triangulaire, alterne
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Cône dressé

Exposition



Soleil






Betula papyrifera

Bouleau à papier

White birch

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale doublement dentée
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Cône long

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Feuille en forme de cœur






Betula populifolia

Bouleau gris

Gray birch

Dimensions



Feuillage



Feuille triangulaire, alterne
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Cône long

Exposition



Soleil






Carpinus caroliniana

Charme de Caroline

Blue-beech

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale, allongée, dentée

Couleur à l'automne : jaune, orange et rouge écarlate

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Akène en grappe pendante

Exposition



Mi-ombre / ombre





Carya cordiformis

Caryer cordiforme

Bitternut hickory

Dimensions



Feuillage



Feuille composée de 7 à 11 folioles
Couleur à l'automne : jaune verdâtre

Fleur



Floraison au printemps, chaton, petites grappes de
2 à 3 fleurs

Fruit



Noix recouverte d'une écorce non comestibles

Exposition




Soleil / mi-ombre

Caractéristique unique

L'écorce est quelque fois une source de nourriture
pour le castor et d'autres petits mammifères.





Carya ovata

Caryer ovale

Shagbark hickory

Dimensions



Feuillage



Feuille composée de folioles allongées
Couleur à l'automne : jaune doré bronzé

Fleur



Chaton jaunâtre

Fruit



Noix comestible à saveur de pacane

Exposition



Soleil / mi-ombre

Caractéristique unique

Plante très allergène






Catalpa Speciosa

Catalpa de l'Ouest

Northern catalpa

Dimensions



Feuillage



Feuille grande, en forme de cœur, pouvant atteindre 30 cm
Couleur à l'automne : vert jaunâtre

Fleur



Floraison au printemps et cyclique (tous les 2 à 3 ans), fleur blanche et marquée de jaune et de rouge pourpre, spectaculaire

Fruit



Longue gousse de 20 à 50 mm de longueur

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Ne fleurit qu'à partir de la quinzième année de croissance






Celtis occidentalis

Micocoulier occidental

Common hackberry

Dimensions



Feuillage



Feuille lancéolée, asymétrique, dentée
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, petite fleur verdâtre

Fruit



Drupe pourpre foncé noirâtre

Exposition



Soleil /mi-ombre






Corylus colurna

Noisetier de Byzance

Turkish filbert

Dimensions



Feuillage



Feuille cordée, ovale, large, dentée

Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Noisette

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Le fruit est comestible






Elaeagnus angustifolia

Olivier de Bohème

Russian olive

Dimensions



Feuillage



Feuillage vert grisâtre au revers argenté

Fleur



Floraison au printemps, fleur jaunâtre odorante

Fruit



Olive grisâtre, comestible

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Nourrit les oiseaux
Feuillage exceptionnel





Fagus grandifolia

Hêtre à grandes feuilles

American beech

Dimensions



Feuillage



Feuille caduque, alterne, simple
Feuillage à l'automne : bronze doré

Fleur



Fleur mâle jaunâtre et fleur femelle verdâtre

Fruit



Noix comestibles appelées faînes

Exposition



Ombre /plein soleil /mi-ombre

Caractéristique unique


De nombreux oiseaux et mammifères raffolent de ses faînes.





Gleditsia tricanthos 'Ruby Lace' Févier d'Amérique sans épine 'Ruby Lace' 'Ruby Lace' Honeylocust

Dimensions



Feuillage



Feuille de couleur rouge bronze au printemps et de couleur vert bronze l'été

Fleur



Floraison au printemps, petite fleur verdâtre

Fruit



Gousse longue et plate

Exposition



Soleil





Gymnocladus dioica

Chicot du Canada

Kentucky coffeetree

Dimensions



Feuillage



Feuille grande et doublement composée
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison en été, fleur en grappe blanchâtre

Fruit




Gousse rougeâtre

Exposition



Soleil





Juglans cinerea

Noyer cendré

Butternut

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale, composée de 11 à 17 folioles
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Ovoïde, vert, couvert de pilosité gluante,
noix comestible

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Produit des noix vers l'âge de 20 ans et en donne
une bonne quantité tous les deux ou trois ans





Juglans nigra

Noyer noir

Black walnut

Dimensions



Feuillage



Feuille ovale, composée de 14 à 22 folioles
Couleur à l'automne : vert

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Noix de 30 à 50 mm de diamètre

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Noix comestible. Son bois possède une grande valeur commerciale.






Liriodendron tulipifera

Tulipier de Virginie

Tulip tree

Dimensions



Feuillage



Feuille de 2 à 4 lobes

Couleur à l'automne : jaune or

Fleur



Floraison en été, fleur simple vert jaunâtre

Fruit



Cône écailleux

Exposition



Soleil /mi-ombre






Ostrya virginiana

Ostryer de Virginie

Iron wood

Dimensions



Feuillage



Feuille caduque simple, alterne

Feuillage à l'automne : jaune orangé

Fleur



Chaton mâle préformé durant l'hiver

Chaton femelle à l'extrémité des nouvelles pousses

Fruit



Sac brun jaune à pilosité pointue

Exposition



Ombre /plein soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Feuillage ressemble au bouleau jaune






Platanus occidentalis

Platane de Virginie

American Planetree

Dimensions



Feuillage



Grande feuille alterne, vert vif
Couleur à l'automne : jaune orangé

Fleur



Floraison au printemps

Fruit



Akène, reste sur l'arbre en hiver

Exposition



Soleil

du peuplier sont une source

importante de résine pour les abeilles.





Prunus pensylvanica

Cerisier de Pennsylvanie

Pin cherry

Dimensions



15 m

7 m



Feuillage



Feuille finement dentée, allongée et pointue
Couleur à l'automne : rouge vif

Fleur



Floraison au printemps, longue grappe
Fleur blanche

Fruit



Cerise juteuse rouge vif

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Les fruits sont un régal pour les oiseaux.





Prunus serotina
Cerisier tardif
Black cherry

Dimensions



Feuillage



Feuille lancéolée

Couleur à l'automne : jaune orangé

Fleur



Floraison au printemps, longue grappe
pendante blanche

Fruit



Drupe noire

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Les fruits sont un régal pour les oiseaux.





Quercus alba

Chêne blanc

White oak

Dimensions



Feuillage



Feuille profondément lobée
Couleur à l'automne : rouge-violet

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Gland comestible de 20 à 25 mm

Exposition



Soleil






Quercus rubra

Chêne rouge

Red oak

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée très découpée
Couleur à l'automne : rouge

Fleur



Floraison au printemps
Chaton jaunâtre

Fruit



Gland de 20 mm

Exposition



Soleil






Quercus coccinea

Chêne écarlate

Scarlet oak

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée

Couleur à l'automne : écarlate

Fleur



Floraison au printemps, chaton jaune-verdâtre

Fruit



Gland de 15 à 25 mm de diamètre

Exposition



Soleil






Quercus macrocarpa

Chêne à gros fruits

Bur oak

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée

Couleur à l'automne : jaune orangé

Fleur



Floraison au printemps, chaton verdâtre

Fruit



Gland de 20 à 40 mm de diamètre

Exposition



Soleil






Quercus palustris 'Green Pillar'

Chêne des marais 'Green Pillar'

'Green Pillar' Pin oak

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée

Couleur à l'automne : rouge vin

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Gland de 12 mm de diamètre

Exposition



Soleil






Quercus palustris

Chêne des marais

Pin oak

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée

Couleur à l'automne : rouge vin

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Gland de 12 mm de diamètre

Exposition



Soleil






Quercus robur fastigiata

Chêne anglais fastigié

Pyramidal English oak

Dimensions



Feuillage



Feuille lobée

Couleur à l'automne : brun

Fleur



Floraison au printemps, chaton

Fruit



Gland de 20 mm à 40 mm de diamètre

Exposition



Soleil






Robinia 'Frisia'

Robinier faux-acacia 'Frisia'

'Frisia' Black locust

Dimensions



Feuillage



Feuille alterne composée de 6 à 19 folioles
Couleur à l'automne : jaune clair

Fleur



Floraison en été, grappe blanche

Fruit



Gousse brune

Exposition



Soleil






Tilia americana 'Redmond'

Tilleul d'Amérique 'Redmond'

'Redmond' American linden

Dimensions



Feuillage



Feuille cordée, dentée

Couleur à l'automne : vert jaunâtre

Fleur



Floraison en été, cyme pendante jaunâtre

Fruit



Capsule

Exposition



Soleil






Tilia cordata 'Greenspire'

Tilleul à petites feuilles 'Greenspire'

'Greenspire' Little leaf linden

Dimensions



Feuillage



Feuille cordée, dentée, arrondie
Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Floraison en été, cyme pendante jaunâtre

Fruit



Capsule

Exposition



Soleil /mi-ombre






Ulmus Pumila

Orme de Sibérie

Siberian elm

Dimensions



Feuillage



Feuille simple, petite, elliptique, pointue au bout, dentée. Couleur à l'automne : jaune

Fleur



Fleur jaunâtre au printemps

Fruit



Samare

Exposition



Ombre /plein soleil /mi-ombre

Cararctéristique unique






Abies balsamea

Sapin baumier

Balsam fir

Dimensions



Aiguille



Aiguilles aplaties de 15 à 25 mm de longueur
Couleur à l'année: vert

Fruit



Cône érigé de 50 à 70 mm de longueur

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Le sapin baumier est un aliment très prisé en hiver par la gélinothe huppée.






Ginkgo biloba

Arbre aux quarante écus

Maidenhair tree

Dimensions



Feuillage



Feuille en forme d'éventail divisée en 2 lobes
Couleur à l'automne : jaune or

Fleur



Mâle, chaton

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique


Très résistant à la pollution urbaine
Bien qu'il ressemble à un feuillu,
c'est un conifère.





Larix laricina Mélèze laricin Tamarack

Dimensions



Aiguille



Aiguilles isolées de 25 à 35 mm de longueur
Couleur à l'automne : jaune

Fruit



Cône de 15 à 20 mm de longueur

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Le mélèze pousse particulièrement bien dans les endroits frais et humides, comme les tourbières et les marécages.





Picea abies

Épinette de Norvège

Norway spruce

Dimensions



Aiguille



Aiguilles courtes et isolées
Couleur à l'année : vert foncé

Fruit



Cônes cylindriques pendants

Exposition



Soleil/ mi-ombre

Caractéristique unique

Demande peu d'entretien





Picea glauca **Épinette blanche** White spruce

Dimensions



Aiguille



Aiguilles quadrangulaires et isolées
Couleur à l'automne : vert pâle ou argenté

Fruit



Cône pendant cylindrique et oblong

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique


Peut vivre 200 ans





Picea mariana
Épinette noire
Black spruce

Dimensions



Aiguille



Aiguilles quadrangulaires et droites
Couleur à l'année : vert bleuté

Exposition



Soleil/ mi-ombre

Caractéristique unique

Les épinette noires sont réputées pour ne pas très bien résister aux vents.






Picea amorika

Épinette de Serbie

Serbian spruce

Dimensions



Aiguille



Aiguilles quadrangulaires et isolées
Vert foncé brillant à revers blanchâtre

Fruit



Cônes pourpres

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Arbre haut et étroit






Picea pungens 'Glauca'

Épinette du Colorado

Colorado spruce

Dimensions



Aiguille



Aiguilles quadrangulaires et isolées
Couleur à l'année: vert bleuté

Fruit



Cône pendant et cylindrique

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Valeur ornementale élevée






Picea rubens

Épinette rouge

Red spruce

Dimensions



Aiguille



Aiguilles quadrangulaires, courbées et acuminées
Vert jaunâtre brillant. Couleur d'hiver : vert foncé

Fruit



Cônes ovoïdes

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Valeur ornementale élevée






Pinus banksiana

Pin gris

Jack pine

Dimensions



Aiguille



Aiguilles persistantes, réunies en faisceaux de 2
Couleur à l'année Vert jaunâtre pâle

Fruit



Cône de formes variables, assymétriques

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Il est très peu exigeant et est très résistant aux vents.






Pinus nigra austriaca

Pin noir d'Autriche

Austrian pine

Dimensions



Aiguille



Aiguilles groupées par 2
Couleur à l'année : vert foncé

Fruit



Cône pendant de 50 à 120 mm de longueur

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Souvent planté en bordure des routes
et dans les aménagements paysagers





Pinus resinosa

Pin rouge

Red pine

Dimensions



Aiguille



Aiguilles droites, cassantes et luisantes groupées par 2
Couleur à l'année : vert foncé

Fruit



Cône ovoïde, pendant et symétrique

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

Très utilisé pour faire des poteaux servant à la transmission de l'électricité. La pinière de Saint-Lazare en de nombreux.





Pinus strobus

Pin blanc

Eastern white-pine

Dimensions



Aiguille



Aiguilles souples et fines groupées par 5
Couleur à l'année : vert bleuté

Fruit



Cône pendant de 80 à 200 mm de longueur

Exposition



Soleil /mi-ombre

Caractéristique unique

Il y en a une grand quantité
dans la pinière de Saint-Lazare.






Pinus sylvestris

Pin sylvestre

Scotch pine

Dimensions



Aiguille



Aiguilles groupées par 2, rigides et tordues
Couleur à l'année : vert bleuâtre

Fruit



Cônes ovoïdes, pendants et asymétriques

Exposition



Soleil

Caractéristique unique

L'origine des graines est varié; il peut ainsi apparaître sous plusieurs formes différentes.






Tsuga canadensis

Pruche du Canada

Eastern hemlock

Dimensions



Aiguille

Aiguilles aplaties, fines et courtes
Couleur à l'année : vert

Fruit



Cône, pendant à écailles arrondies
de 15 à 25 mm

Exposition



Mi-ombre/ombre

Caractéristique unique

Éviter de planter cette espèce
dans des endroits venteux.

